

OBSERWACJE DOTYCZĄCE NIETRZYMANIA MOCZU U PSÓW I KOTÓW W UJĘCIU TCM

WPROWADZENIE

W praktyce weterynaryjnej spotykamy się z problemem nietrzymania moczu. TCM dzieli przyczyny na zewnętrzne i wewnętrzne patogenne faktory. Metoda ta nie ma zastosowania w przypadku wad wrodzonych, np. przetrwały moczownik i inne.

Zewnętrzne energie klimatów mogą stawać się patogenami wnikając głównie przez warstwę Tai Yang. Element wody podlega wpływowi patogenu zimna/nerka i pęcherz moczowy/, wiatr przypisuje się elementowi drzewa/wątroba woreczek żółciowy/, gorąco elementowi ognia /serce jelito cienkie/, wilgoć elementowi żołądka i śledziony/żywiół ziemi/, płucem przypisuje się suchość jako czynnik wnikający.

Zewnętrznym patogennym faktorem przy nietrzymaniu moczu może być uraz mechaniczny np. po wypadku, również uraz mechaniczny spowodowany piaskiem; kamicą układu moczowego. Wynika ona ze stanu nadmiaru gorąca i wilgoci w układzie moczowym. Żołądek przyjmuje pożywienie g u Qi czyste składniki przejmuje śledziona/wytwarza śluz/ podobnie musi strawić emocje którym podlega zwierzę. Nadmiar gorąca wątroby podgrzewa śluz w kręgu funkcjonalnym nerka pęcherz moczowy, w ten sposób śluz zasychając tworzy złogi które kalecząc powodują uraz. W tym przypadku kot kojarzy sobie kuwetę z bólem i oddaje moczelementowi ognia /serce jelito cienkie/, wilgoć elementowi żołądka i

śledziony/żywiół ziemi/, płucem przypisuje się suchość jako czynnik wnikający.

Zewnętrznym patogennym faktorem przy nietrzymaniu moczu może być uraz mechaniczny np. po wypadku, również uraz mechaniczny spowodowany piaskiem; kamicą układu moczowego. Wynika ona ze stanu nadmiaru gorąca i wilgoci w układzie moczowym. Żołądek przyjmuje pożywienie g u Qi czyste składniki przejmuje śledziona/wytwarza śluz/ podobnie musi strawić emocje którym podlega zwierzę. Nadmiar gorąca wątroby podgrzewa śluz w kręgu funkcjonalnym nerka pęcherz moczowy, w ten sposób śluz zasychając tworzy złogi które kalecząc powodują uraz. W tym przypadku kot kojarzy sobie kuwetę z bólem i oddaje mocz poza nią, pies może mimowolnie oddawać mocz w mieszkaniu. Przyjmuje się za fizjologiczne oddawanie przez psy samce po kilka kropel moczu tam gdzie wyczują zapach moczu innego psa.

TCM wyróżnia też wewnętrzne patogenne faktory. Radość strach, gniew, smutek, złość, traktuje jako wewnętrzne patologiczne energie=emocje. Pies z nadmiernej radości oddaje mocz, tłumaczy się brakiem równowagi w elemencie ognia. cyt za 3/ strach radość stres -osłabienie hamowania korowego./potwierdza obserwacje lekarzy TCM według których mózg podlega nerce. strach może powodować bezwiedne oddawanie kału i moczu co wynika ze słabości nerki; Qi opuszcza nerki. Gniew i złość/element drzewa/ może sprawić, że kot syjamski pamiętając doznaną krzywdę odda mocz do butów sprawcy albo obrazi się i przyjdzie za trzy dni.

Zależnie od przyczyny można wykorzystać rozmaite metody. Należy przeprowadzić dokładne badanie wg medycyny akademickiej ponieważ opisane zależności wg TCM nie wyczerpują tematu. Należy znać granice metody która nie jest cudownym sposobem na każdą przypadłość. Odpowiednio wybrana może dać wyniki bez środków leczniczych.

Wykluczenie przyczyn związanych ze zmianami w rdzeniu kręgowym, kostnej części kręgosłupa, miednicy, ucisku wzdętych jelit lub silnie wypełnionych pokarmem na pęcherz moczowy, zapalenia otrzewnej czy innego promieniującego bólu który może zacierać obraz kliniczny pozwala na włączenie alternatywnej metody wg TCM.

W przypadku Zaburzeń Yin Yang gdy dojdzie do dysharmonii pomiędzy Yang =cieplem i Płynami=śluzem należy zlokalizować element który jest w dysharmonii. W uproszczonej zależności przypadku patologii w kręgu funkcjonalnym wątroby nadmiar Yang niedobór Yin śluz jest nadmiernie podgrzewany. Według punktów antycznych można zastosować sedowanie dziecka przy nadmiarze matki wątroba 2, oraz Pęcherz moczowy 65. Przy nadmiarze babcię pobudzać Wątroba 8 Pęcherz moczowy 67.

Przykładem ilustrującym dysbalans Yin Yang może być syndrom urologiczny kotów gdzie mocz jest jałowy a mimo to następuje zaczopowanie dróg moczowych, przy prawidłowym pH moczu. W mojej praktyce ciekawe wyniki dała stymulacja punktu Pęcherz moczowy 40 jednostronnie w dole podkolanowym autopunkterem lub automeridianem co najmniej jedną minutę raz w tygodniu. Punkt zwany jest też mistrzem grzbietu. Przy lekkich meridianitis zniknęły punkty Shu po stymulacji !

Suka beagle sterylizowana po pierwszej cieczie: dwukrotna stymulacja wyregulowała problem oddawania moczu w mieszkaniu. Cyt za 3/ Zabieg sterylizacji znacznie podnosi ryzyko wystąpienia niewydolności cewki moczowej. Mówi się o niedoborze estrogenów u suk sterylizowanych. Jednak w praktyce leczenie przypadków nietrzymania moczu estrogenami często nie przynosi spodziewanego rezultatu. Hormony płciowe są jednym z wielu czynników wpływających na pracę mięśniówki pęcherza moczowego, cewki moczowej a ich niedobór może nasilać objawy a nie jak się powszechnie sądzi wywoływać je. W leczeniu wspomagającym cyt za 3 można zastosować np. Plantago major 6c, 30c, Cantharis 6c, 30c, Alumina 6c, 30c. /Uwaga własna: przy sterylizacji należy zachować ostrożność aby nie naruszyć plexus vesic. obok ściany pęcherza, włókna wegetatywne między innymi biorą udział w odruchu oddawania moczu. /Ilustracja cyt za 2/

Suka Fifi po wypadku z niedowładem nóg, mimowolnym oddawaniem kału i moczu; do leczenia zasadniczego Catosalem i Nivalinem wspomagająco włączono elektrostymulację prądem - autopunktera 1 minutę

Pies Felek oddający mocz w mieszkaniu; zdiagnozowano białkomocz paskami Nonaphan i 20% kwasem sulfosalicylowym, podano Enrofloksacynę, Ginial Ziele Skrzypu, Rdestu ptasiego i Kłącze perzu w odwarze, bez akupunktury.

Kot Kozbi ze stwierdzonym krwiomoczem Hematokryt 15 ! stwierdzono w odwirowanym osadzie niczenie podano Stronghold i Catosal Uropet.

Kotka Mimi po urazie kręgosłupa z mimowolnym oddawaniem kału i moczu Synulox i stymulacja Pm 40

Kotka Brzózka po sterylizacji zaczęła oddawać mocz w pozycji nienaturalnej na wyprostowanych tylnych kończynach, właścicielka stwierdziła poprawę po stymulacji Pm 40 /w osłonie z amoksyliny./

Przy stwierdzonej kamicy układu moczowego cyt za 1/ stosowanie moxy uwalnia zwieracz pęcherza od podrażnienia, przywraca ruch i pracę w konsekwencji powoduje poprawę oddawania moczu co wspomaga leczenie. Moxybustię można wykonać w punktach Pm 27, Pm 29, Pm 30 Gv20, Gv1-4 /tłumaczenie własne/1/

Literatura

1 DVM Hosaka Torashige Moxybustion

2 J Moczy Weterynaryjna Diagnostyka Kliniczna

3 Artykuł MW 7-8 2005 str 41